

Dimension de la qualité - EFFICACITÉ :
Les soins ou les services, les interventions ou les actions mènent aux résultats souhaités.

Indicateurs	Valeur du N.-B.	Valeur canadienne	Score de l'indice de rendement du N.-B.	Note de l'indice de rendement du N.-B.	Source
Secteur de soins de santé - SANTÉ PRIMAIRE :					
Les soins qu'une personne reçoit lorsqu'elle se dirige la première fois vers le système de santé et ce, avant d'être référée ailleurs. Ce secteur fait la promotion de la santé, la prévention de la maladie et des blessures et le diagnostic et le traitement des maladies.					
Ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé	19.3 % (2008)	16.4 %	85	E	Statistique Canada Tableau 105-0501 http://www.statcan.gc.ca
Soins directs aux patients avec une composante d'enseignement offert par un médecin de famille ou omnipraticien, basée sur la totalité d'heures de travail par semaine	8.1 % (2007)	7.2 %	113	B	Sondage national des médecins http://www.nationalphysiciansurvey.ca/nps
Secteur de soins de santé - SOINS AIGUS :					
Les soins offerts dans les hôpitaux ou les établissements psychiatriques.					
Faible poids à la naissance (naissances vivantes moins de 2 500 grammes)	4.9 % (2007)	6.0 %	122	A	Statistique Canada Tableau 102-4509 http://www.statcan.gc.ca
Taux ajusté selon les risques de réadmission à la suite d'un infarctus aigu du myocarde (IAM)	6.2 % (2005-2008)	5.1 %	82	E	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM)	10.4 % (2005-2008)	9.4 %	90	D	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de mortalité à l'hôpital dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral	15.9 % (2005-2008)	18.0 %	113	B	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de fracture de la hanche à l'hôpital (par 1 000)	0.8 (2005-2008)	0.8	100	C	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de réadmission à la suite d'une crise d'asthme	2.7 % (2005-2008)	4.5 %	167	A+	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de réadmission à la suite d'une prostatectomie	3.2 % (2005-2008)	2.4 %	75	F	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Taux ajusté selon les risques de réadmission à la suite d'une hystérectomie	1.1 % (2005-2008)	1.1 %	100	C	Institut canadien d'information sur la santé - <i>Indicateurs de santé 2009</i> http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2150_F&cw_topic=2150&cw_rel=AR_152_F
Estimation de survie à cinq ans pour les sièges primaires de cancer (ratio de survie relative)	58 % (2000)	59.8 %	97	C	Statistique Canada Table 103-1573 http://www.statcan.gc.ca

Secteur de soins de santé - DE SOUTIEN/SPÉCIALITÉ D'APPOINT :					
Les soins reçus dans la communauté ou dans les cliniques ambulatoires qui visent à prévenir, contrôler ou soulager les complications et/ou les effets secondaires afin d'améliorer le confort des patients et leur qualité de vie.					
Lésions auto-infligées (suicide) – Taux de mortalité ajusté selon l'âge (pour 100 000 personnes)	12.6 (2005)	10.9	87	D	Statistique Canada Table 102-0552 http://www.statcan.gc.ca
Taux de réadmission dans l'année dans un établissement de soins aigus pour individus chez qui une maladie mentale a été diagnostiquée (par 100 personnes)	24.6 (2005-2006)	22.9	93	D	Institut canadien d'information sur la santé – Services de santé mentale en milieu hospitalier 2005-2006 http://www.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=AR_364_F
Indice de rendement global			102	C	

La valeur canadienne est la moyenne nationale ou un point repère national.

Méthode de classement : L'analyse est basée sur les données des indicateurs qui étaient disponibles lorsque le rapport a été terminé. Selon la définition de l'indicateur, le score est établi de deux manières. Si une augmentation de la valeur de l'indicateur représente une « amélioration », le score est obtenu en divisant la valeur compilée du Nouveau-Brunswick par l'indicateur spécifique de la valeur canadienne. Par contre, lorsqu'une diminution de la valeur de l'indicateur représente une « amélioration », la note est établie en divisant la valeur canadienne de l'indicateur spécifique par la valeur néo-brunswickoise. Ce montant est ensuite multiplié par 100 et donne le score de l'indice du rendement. Tous les chiffres ont été arrondis au chiffre supérieur.

Exemple : Si le score de l'indice du rendement du Nouveau-Brunswick est 100 (grade de C), cela implique que le rendement néo-brunswickois et le rendement canadien sont les mêmes.

Grille de pointage : A+ = >122, A = 114-122, B = 105-113, C = 96-104, D = 87-95, E = 78-86, F = <78

Cette grille de pointage tient compte des indicateurs qui se comparent aux autres provinces et territoires et qui ont des petites et grandes de la moyenne nationale.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors de la planification et de l'élaboration de politiques, la note de l'indice composé ne doit pas être considérée indépendamment des indicateurs sur lesquels il est basé.

Veuillez noter qu'une note ne correspond pas à de meilleurs résultats de santé ; elle correspond seulement à la qualité des services fournis lorsque nous comparons le Nouveau-Brunswick avec le reste du Canada.